

داروی سدیم والپروات



گردآورنده: دکتر هانیه بنی اسدی پور

استادیار گروه روان پزشکی

معاونت آموزشی بیمارستان بوستان

مهر ۱۴۰۴

سدیم والپروات یک داروی روان پزشکی است که از دسته داروهای ضد تشنج تثبیت کننده خلق می باشد و از آن برای درمان تشنج (صرع) و اختلال دوقطبی (شیدایی و افسردگی حاد) و جلوگیری از عود علایم استفاده می شود. هم چنین از این دارو جهت پیشگیری از سردرد میگرن و به عنوان درمان کمکی اسکیزوفرنی (روان پریشی) استفاده می شود. در کنترل حملات خشم و پرخاشگری در اختلال شخصیت مرزی، درمان ترک الکل و پیشگیری از عود علایم خلقی نیز این دارو کاربرد دارد.

سایر اسامی دارو: Depakene, Depakote, Orlept

اشکال دارویی: شربت، کپسول و نوع تزریقی

دی والپرونکس سدیم به صورت قرص و پودر (می تواند داخل غذا ریخته شود) موجود می باشد.

قرص ۲۰۰ میلی گرم با پوشش روده ای (انتریک کوئند)، قرص آهسته روش ۲۰۰ میلی گرم، قرص رهاکین ۲۰۰ میلی گرم، قرص رهاکین ۵۰۰ میلی گرم آهسته روش، شربت والپروات سدیم ۱۲۰ میلی لیتر، آمپول ۱۰۰ میلی گرم، ویال ۴۰۰ میلی گرم از دیگر اشکال دارویی آن است.

موارد منع مصرف

در حساسیت شدید به دارو و بارداری این دارو منع مصرف دارد. در صورت تصمیم به بارداری و شیردهی با پزشک مشورت نمایید.

عوارض جانبی

سدیم والپروات مثل همه داروها می تواند باعث عوارض جانبی شود. اگرچه همه بیماران دچار این عوارض نمی شوند.

عوارض جانبی شایع

این عوارض جانبی شایع شامل درد معده، احساس بیحالی، تهوع، استفراغ، اسهال، لرزش خفیف، افزایش وزن و نامنظم شدن پریود می باشد.

این عوارض معمولاً خفیف هستند و خود به خود از بین می روند. اما اگر نمی توانید این عوارض را تحمل کنید یا برطرف نشدند به پزشک مراجعه کنید.

طبق نظر پزشک دارو را مصرف کنید و از مصرف خودسرانه داروها پرهیز نمایید. *توجه: اگر دارو را به صورت منظم مصرف نکنید یا ناگهانی قطع کنید، امکان بروز خطرات جدی وجود دارد. زیرا ممکن است بیماری بهبود نیابد و دچار تشنج شود. هنگام مصرف دارو از الکل و مشروبات استفاده نکنید زیرا می تواند باعث خواب آلودگی شدید شود.	توجهات مربوط به مصرف دارو قرص باید همراه با مایعات مصرف شود. بلع قرص بدون آب ممکن است باعث تحریک مخاط ناحیه دهان و گلو شود. تداخلات دارویی قبل از مصرف دارو، لیستی از تمام داروهای خود تهیه کنید و در اختیار پزشک خود دهید. داروهایی که بیشتر احتمال تداخل با داروی سدیم والپروات دارند شامل: کاربامازپین، لاموترژین، توپیرامات، آسپرین، وارفارین و قرص های جلوگیری از بارداری حاوی استروژن، فنمباربیتال، فنی توین، داروهای ضد ایدز (زیدوودین)، دیازپام و برخی داروهای ضد افسردگی مانند آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین مقدار مصرفی دارو توجه داشته باشید دوز درمان برای بیماری های مختلف بسته به نوع بیماری و پاسخ به درمان، و صلاح دید پزشک معالج متفاوت است.	عوارض جانبی جدی شامل زرد شدن پوست بدن یا زرد شدن سفیدی چشم، تهوع شدید و طولانی، استفراغ و دل درد طول کشیده، کبودی بدن یا خونریزی غیرعادی، تورم دهان، لب و زبان، تب، مشکل در تنفس یا صحبت کردن، لرزش شدید، اختلال سطح هوشیاری و خواب آلودگی می باشند. در صورت داشتن این مشکلات سریعاً با پزشک تماس بگیرید. آزمایشات دوره ای آزمایش CBC (شمارش گلبول سفید و قرمز، شمارش پلاکت) هر ۶ تا ۱۲ ماه، آزمایش آنزیم های کبدی هر ۶ تا ۱۲ ماه انجام گیرد. موارد احتیاط اگر در آزمایشات کبدی، افزایش آنزیم های کبدی رخ داد، این به معنای قطع داروها نیست بلکه در این موارد به پزشک اطلاع دهید و طبق صلاحدید پزشک اقدام نمایید. در صورت نارسایی کبد یا مشکلات انعقادی یا نیاز به مصرف داروهای ضدانعقادی قبل از شروع دارو با پزشک خود مشورت کنید.
---	---	--