



کلوزاپین



گردآورنده: عاطفه عمرانی (کارشناس پرستاری)

تحت نظارت: دکتر فاطمه بهشت آیین

سوپروایزر آموزش کارکنان

دکتر هانیه بنی اسدی پور

معاونت آموزشی بیمارستان بوستان

مهر ۱۴۰۴

کلوزاپین یکی از موثرترین داروها برای کنترل بیماری اسکیزوفرنی است اما ممکن است برای بیماریه‌های دیگر روانپزشکی نیز تجویز شود. این دارو معمولاً زمانی که بیمار به دیگر داروها پاسخ مناسب ندهد تجویز می‌شود. این دارو می‌تواند خطر خودکشی را در افراد کاهش دهد.

نحوه مصرف و دوز

درمان معمولاً با دوز کم (مثلاً ۱۲.۵ میلی گرم یک یا دو بار در روز) شروع می‌شود و جهت کاهش خطر عوارض قلبی عروقی و افت فشار خون باید به صورت تدریجی افزایش یابد.

در طول دو هفته اول، معمولاً تا دوز روزانه ۱۵۰ تا ۲۲۵ میلی گرم (تقسیم شده) افزایش داده می‌شود. پس از آن، ممکن است افزایش هفتگی یا دو بار در هفته تا حداکثر دوز مجاز انجام شود.

هنگام قطع دارو یا بازگشت به مصرف دارو پس از یک فاصله زمانی، باید با احتیاط و با شروع مجدد آهسته انجام شود.

دوز ممکن است بر اساس تداخلات دارویی، وضعیت کبدی یا عملکرد کلیوی فرد تنظیم شود.

عوارض جانبی

کاهش فشار خون، خواب آلودگی، سردرد، سرگیجه، تاری دید، آب ریزش از دهان، افزایش بزاق، تهوع، استفراغ، دردهای شکمی، یبوست، کاهش گلبول سفید خون، التهاب ماهیچه‌های قلب

نکته مهم: این دارو همانند داروهای دیگر عوارض دارد ولی این به معنای دلیلی برای قطع یا کاهش دوز دارو توسط بیمار نمی‌باشد و باید حتماً تحت نظر پزشک به صورت دقیق مصرف شود.

رفرنس: -Mosby's 2021 Nursing Drug Reference. 2021, Thirty-Fourth Edition - خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک، ۲۰۲۲ - بانک اطلاعات داروهای ژنریک. قمری کامران. ۱۳۹۶	- برای کاهش خشکی دهان از یخ، نوشیدن آب و محصولات بهداشتی دهان استفاده کنید. - بیمار ممکن است دچار یبوست و تهوع شود که مصرف مایعات و غذاهای فیبردار میتواند عوارض آن را کم کند. - در صورت داشتن علائم قلبی مانند درد قفسه سینه، تپش و تنگی نفس سریعاً به پزشک مراجعه کنید. - یکی از عوارض جدی کلوزاپین کاهش گلبول های سفید خون است. برای پیشگیری از این مشکل روانپزشک دارو را به تدریج افزایش می‌دهد. - قبل از شروع درمان، می بایست میزان گلبول های سفید خون پایش شود، سپس تا ۶ ماه به صورت هفتگی و سپس هر دو هفته یک بار. نکته بسیار مهم: یکی از علائم کاهش گلبول سفید خون تب است بنابراین در صورتی که بیمار دچار تب یا علائم سرماخوردگی شد سریعاً به پزشک مراجعه کنید.	موارد احتیاط حساسیت به کلوزاپین، کاهش شدید گلبول سفید، بیماری قلبی حاد، اختلالات ریتم قلب، تشنج کنترل نشده، مشکلات شدید کبدی یا کلیوی، مصرف همزمان داروهای سرکوبگر ایمنی، در دوران بارداری و شیردهی با احتیاط زیاد مصرف شود. توجه: در بیماران مسن مبتلا به روان‌پریشی مرتبط با زوال عقل، استفاده آن توصیه نمی‌شود. نکات مهم - به بیمار آموزش داده شود که تجربه خواب آلودگی ممکن است در ابتدای درمان رخ دهد. - به دلیل احتمال افزایش وزن، بیمار باید فعالیت بدنی داشته باشد. - احساس سبکی سر و یا سیاهی رفتن چشم به دلیل کاهش فشار خون است که باید به پزشک اطلاع داده شود.
--	--	--