

کوئتیپاین



گردآورنده: دکتر فاطمه بهشت آیین

سوپروایزر آموزش کارکنان

تحت نظارت: دکتر هانیه بنی اسدی پور

استادیار گروه روان پزشکی

معاونت آموزشی بیمارستان بوستان

مهر ۱۴۰۴

کوئتیپاین (Quetiapine) یک داروی ضد روان پریشی است که برای کنترل علائم اسکیزوفرنی، دوره‌های شیدایی و افسردگی در اختلال دوقطبی و افسردگی اساسی تجویز می‌شود. این دارو با تأثیر بر مواد شیمیایی مغز مانند دوپامین و سروتونین عمل می‌کند.

کوئتیپاین را با نام‌های تجاری زیر می‌شناسند:

Atrolak, Biquelle, Seroquel, Sondate, Zaluron, Tranqopine

این دارو، به اشکال زیر فقط با نسخه در دسترس است:

- قرص رهش فوری (IR)
- قرص آهسته‌رهش (ER)

میزان مصرف کوئتیپاین (ترانکوپین)

کوئتیپاین، در دوزهای زیر عرضه می‌شود:

- قرص رهش فوری در دوزهای ۲۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی‌گرم
- قرص آهسته‌رهش در دوزهای ۵۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی‌گرم
- شربت حاوی ۲۰ میلی‌گرم کوئتیپاین در ۱ میلی‌لیتر.

عوارض جانبی رایج

- احساس خواب‌آلودگی در طول روز
- مشکل در حرکت
- سردرد
- سرگیجه
- ضعف
- اضطراب و تحریک‌پذیری
- افزایش وزن یا تغییر در اشتها
- یبوست
- خشکی دهان
- ناراحتی معده یا استفراغ
- کمردرد
- سینه‌های متورم، درد در سینه‌ها یا نشت شیر مادر
- پریودهای نامنظم یا قطع قاعدگی
- افت ناگهانی فشار خون هنگام ایستادن
- ضربان سریع قلب

عوارض جانبی جدی

این عوارض، شایع نیستند و ممکن است از هر ۱۰۰ نفر در یک نفر رخ دهد. در صورت مشاهده این عوارض، با پزشک خود صحبت کنید:

برای جبران دوز فراموش شده، دو دوز را همزمان مصرف نکنید. - کوئتیاپین فوری اثر نمی کند. تجویز دارو، معمولاً با مقدار مصرف کم شروع می شود و احتمالاً چندین روز یا هفته طول می کشد تا به دوز مناسب خود برسید و علائم بیماری شروع به بهبود کنند. - کوئتیاپین می تواند احساس گرسنگی بیش از حد معمول در شما ایجاد کند، بنابراین ممکن است وزن اضافه کنید. داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل به کنترل این وضعیت کمک می کند. - هنگام مصرف این دارو گریپ فروت یا آب گریپ فروت نخورید، زیرا خطر عوارض جانبی را افزایش می دهد. رفرنس - Mosby's 2021 Nursing Drug Reference . 2021, Thirty-Fourth Edition - بانک اطلاعات داروهای ژنریک. قمری کامران. ۱۳۹۶	- قرص های رهش فوری را به طور کامل با یک لیوان آب ببلعید. قرص را می توانید با غذا یا بدون غذا مصرف کنید. - اگر کوئتیاپین را برای اسکیزوفرنی یا افسردگی مصرف می کنید، ممکن است لازم باشد مصرف آن را برای مدت طولانی، شاید چندین سال ادامه دهید. - اگر آن را برای شیدایی یا افسردگی در اختلال دوقطبی مصرف می کنید، ممکن است لازم باشد آن را برای چند هفته یا چند ماه مصرف کنید. ضمن اینکه شاید پزشک به شما توصیه کند مصرف دارو را برای مدت طولانی، مثلاً چندین سال، ادامه دهید تا از عود کردن علائم جلوگیری کنید. - اگر مصرف یک نوبت کوئتیاپین را فراموش کردید و معمولاً آن را یک بار در روز مصرف می کنید، به محض یادآوری دوز فراموش شده را مصرف کنید، مگر اینکه کمتر از ۱۲ ساعت تا نوبت بعدی باقی مانده باشد. در این صورت، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و نوبت بعدی را در زمان معمول مصرف کنید. - اگر یک نوبت را فراموش کردید و معمولاً دارو را دو بار در روز مصرف می کنید، به محض یادآوری نوبت فراموش شده را مصرف کنید، مگر اینکه کمتر از هشت ساعت تا نوبت بعدی باقی مانده باشد. در این صورت، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و نوبت بعدی را در زمان معمول مصرف کنید.	• انقباض ناگهانی عضله یا پرش در صورت، زبان یا سایر قسمت های بدن که نمی توانید آن را کنترل کنید • عفونت ها مانند علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا، دمای بالا، عفونت گوش، چشم، مثانه یا قفسه سینه • تورم، درد و قرمزی در پا، که ممکن است نشانه لخته شدن خون باشد موارد احتیاط کوئتیاپین: آلرژی به کوئتیاپین، مشکل قلبی مانند ضربان قلب نامنظم (آریتمی)، فشار خون پایین، بیماری پارکینسون یا زوال عقل، سابقه سطوح پایین گلبول سفید، دیابت، صرع، مشکلات کبدی، سابقه احتباس ادرار، پروستات بزرگ شده (بزرگی خوش خیم پروستات)، مشکلات چشمی مانند گلوکوم (آب سیاه) آموزش به بیمار - قرص های آهسته رهش را به طور کامل با یک لیوان آب بدون غذا ببلعید. بهتر است قرص ها را حداقل یک ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا مصرف کنید.
---	--	---